

PRF-behandeling van een perifere zenuw

PIJNZORG

Patiënteninformatie

Een beschadigde zenuw, bijvoorbeeld na een operatie, kan een oorzaak zijn van een pijnlijk gebied op uw lichaam. Er is een behandeling van deze zenuw mogelijk om de klachten te verminderen. De behandeling houdt in dat een naald bij deze zenuw wordt geplaatst en dat met gepulseerde radiofrequente energie de zenuw tot rust wordt gebracht. Daarnaast wordt vaak een ontstekingsremmende stof ingespoten om het effect te versterken. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandelingen.

Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u dit voor de behandeling te overleggen met uw behandelende pijnspecialist.

- U bent mogelijk zwanger;
- U heeft suikerziekte;
- U bent allergisch of over gevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen.

De dag van de behandeling

U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent (minimaal tien minuten voor uw afspraak). U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van minstens 1 uur, u dient de rest van de dag vrij te zijn.

De behandeling

We helpen u eerst om in de juiste houding te liggen of zitten. De naald(en) worden, eventueel met behulp van röntgendoorlichting of een echoapparaat, bij de zenuw geplaatst. Vervolgens wordt de zenuw met radiofrequente stroom behandeld, waardoor er een langdurig effect optreedt. In een aantal gevallen wordt een verdovend en een ontstekingsremmend medicijn ingespoten. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Na de behandeling wordt u op een bed op de dagkliniek gelegd en krijgt u na enige controles een vervolgspraak mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele weken tot twee maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u eerder een gunstig effect ervaart.

Complicaties/bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De PRF-behandeling van een zenuw leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.

Na een PRF-behandeling van een zenuw kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Tijdelijk een doof gevoel van de huid op de plek van de behandeling;
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeding ontstaan.
Dit veroorzaakt soms wat pijn.

Door het ontstekingsremmende medicijn:

- Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie verstoord worden. De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!
- Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden gaan schommelen door het ontstekingsremmende medicijn.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een infectie optreden op de plek waar de injectienaald heeft gezeten. Neem direct contact met ons op als u last krijgt van:

- Lokale roodheid die erger wordt
- Lokale zwelling die erger wordt
- Koorts (hoger dan 38 graden)

Belangrijk

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken Dokkum

Patiënten van DC Klinieken Dokkum bellen in geval van spoed na pijnzorg of maag- en darmonderzoek: 088 0100 960 of na radiologie: 088 0100 985.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



Wilt u een waardering achterlaten?