

Lumbale sympathicusblokkade

PIJNZORG

Patiënteninformatie

Aan de voorzijde van de rugwervels lopen de zenuw vezels van het 'onwillekeurig' zenuwstelsel. Irritatie van deze zenuwen kunnen pijnklachten van de rug naar de benen of alleen in beide benen geven. Vaak voelen de benen dan koud aan. Ook kunt u last van een doof gevoel van de benen, krampen of een overgevoelig been hebben. Deze klachten kunnen we behandelen door het onwillekeurig zenuwstelsel te verdoven. Eerst voeren we een tijdelijke verdoving uit, waarbij het onwillekeurig zenuwstelsel voor 4 tot 6 uur verdoofd is. Indien u gedurende deze periode merkt dat uw klachten duidelijk zijn verbeterd, kunnen we deze injectie nogmaals herhalen maar dan met een vloeistof die langer werkt. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandelingen.

Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u voor het onderzoek contact op te nemen met uw behandelend arts:

- U bent mogelijk zwanger;
- U heeft suikerziekte;
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen.

De dag van de behandeling

U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent (minimaal tien minuten voor uw afspraak). U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van minstens 1 uur, u dient de rest van de dag vrij te zijn.

De behandeling

U ligt op de behandeltafel. De huid wordt verdoofd en er wordt een dunne naald bij de voorzijde van de ruggenwervels geplaatst. Er wordt een verdovingsvloeistof ingespoten, waardoor een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt uitgeschakeld. Indien dit een duidelijk gunstig effect heeft op uw klachten, zal de procedure op een later tijdstip worden herhaald. Dan wordt een vloeistof ingespoten die het onwillekeurige zenuwstelsel voor lange tijd uitschakelt of wordt deze zenuw met elektrische stroom behandeld. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Na de behandeling wordt u op een bed op de dagklinik gelegd en krijgt u na enige controles een vervolgspraak mee.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na enkele weken tot wel 2 maanden kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Complicaties/bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De lumbale sympathicusblokkade leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico's met zich meebrengt.



De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een lumbale sympathicusblokkade optreden:

- Tijdelijke rugklachten;
- Zwelling van het been of de voet voor 1-2 weken;
- Pijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen door een irritatie van een huidzenuw;
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken kan een bloeding ontstaan;
- Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden; de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!
- Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren;

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een infectie optreden op de plek waar de injectienaald heeft gezeten. Neem direct contact met ons op als u last krijgt van:

- Lokale roodheid die erger wordt
- Lokale zwelling die erger wordt
- Koorts (hoger dan 38 graden)

Reanimatie

Alle patiënten bij DC Klinieken worden bij een noodsituatie gereanimeerd. Heeft u een niet reanimeren-verklaring of heeft u met uw arts besproken dat u niet gereanimeerd wilt worden? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico. Hier vindt u meer informatie over vergoedingen en eventuele uitzonderingen: www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

Vragen

Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar: www.dcklinieken.nl/contact of neem contact op met ons Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken

Bel in geval van spoed: 088 0100 998.

Spoedgeval na bezoek aan DC Klinieken Dokkum

Patiënten van DC Klinieken Dokkum bellen in geval van spoed na pijnzorg, of maag- en darmonderzoek: 088 0100 960 of na radiologie: 088 0100 985.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk. Laat daarom uw waardering achter op ZorgkaartNederland.nl!



Wilt u een waardering achterlaten?